

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケール日数	総ケール数
術後補助 mFOLFOX6	オキサリプラチン(L-OHP)	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day1	14日	12ケール (24週間)
	レボポリナート(I-LV)	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1		
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	急速静注	全開で	day1		
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1~3		
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケール日数	総ケール数
術後補助 XELOX	オキサリプラチン(L-OHP)	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day1	21日	8ケール (24週間)
	カベシタビン(Cape)	2000mg/m ²	経口投与	1日2回	day1タ~day15朝		
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケール日数	総ケール数
進行再発 mFOLFOX6	オキサリプラチン(L-OHP)	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day1	14日	PDに至るまで
	レボポリナート(I-LV)	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1		
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	急速静注	全開で	day1		
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1~3		
レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケール日数	総ケール数
進行再発 mFOLFOX6+BV	ベバシズマブ(BV)	5mg/kg	点滴静注	90分*	day1	14日	PDに至るまで
	オキサリプラチン(L-OHP)	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day1		
	レボポリナート(I-LV)	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1		
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	急速静注	全開で	day1		
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1~3		

※BVの投与時間は初回は90分、2回目は60分、忍容性が確認できれば3回目以降は30分での投与も可

レジメン名称	一般名(略語)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケル日数	総クール数
進行再発 mOLFLOX6+Cmab	セツキシマブ(Cmab)(初回)	400mg/m ²	点滴静注	120分	day1	14日	PDIに至るまで
	セツキシマブ(Cmab)(2回目以降)	250mg/m ²	点滴静注	60分	day(1),8		
※KRAS変異陰性型(野生型)のみ	オキサリフルボゾン(I-OPH)	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day1		
	レボポリナート(I-LV)	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1		
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	点滴静注	全閉鎖	day1		
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1~3		

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケル日数	総クール数
進行再発 mOLFOLX6+Pmab ※KRAS変異陰性型(野生型)のみ	バニツムマブ(Pmab)	6mg/kg	点滴静注	1時間	day1	14日	PDに至るまで
	オキサリブチラン(L-OHP)	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day1		
	レボホリナート(I-LV)	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1		
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	急速静注	全閉で	day1		
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1~3		

レジメン名稱	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケル日数	総クール数
進行再発 XELOX	オキサリプラチン(L-OHP) カペバチブリン(Cape)	130mg/m ² 2000mg/m ²	点滴静注 経口投与	2時間 1日2回	day1 day1タービューラル15朝	21日	PDIに至るまで

レジメン名	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケル日数	総ケル数
進行再発 XELOX+BV	ベバシズマブ(BV)	7.5mg/kg	点滴灌漑静注	90分※	day1	21日	PDIに至るまで
	オキサリプラチン(L-OHP)	130mg/m ²	点滴灌漑静注	90分	day1		
	カペシタビン(Cape)	2000mg/m ²	経口投与	1日2回	day1ターミナル15朝		

※BVの投与時間は初回は90分、2回目は60分、忍容性が確認できれば3回目以降は30分での投与も可

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケル日数	総ケル数
進行再発 SOX+BV	ペバシズマブ(BV)	7.5mg/kg	点滴静注	90分※	day1	21日	PDIに至るまで
	オキサリプラチン(L-OHP)	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day1		
	テガフル・ギメラシル・オテラシル(S1)	80mg/m ²	経口投与	1日2回	day1タ~day15朝		

進行再発 FOLFIRI	フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ² 2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注	全閉で 持続静注	day1 46時間	14日 day1~3	PDIに至るまでの期間	
進行再発 FOLFIRI+BV	レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
	ベバシズマブ(BV)	5mg/kg	点滴静注	90分※	day1			
	イリテカント(CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注	90分	day1			
	レボポリナート(I-LV)	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1			
	フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m ²	点滴静注	全閉で	day1			
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1~3			

※PVの投与時間は初回は90分、2回目は60分。乳突窓が確認できれば2回目ドロップは30分での投与可。

レジメン名	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケル日数	総ケル数
進行再発 FOLFIRI+Cmab	セツキシマブ (Cmab) (初回) セツキシマブ (Cmab) (2回目以降)	400mg/m ² 250mg/m ²	点滴静注	120分 60分	day1 day1/8	14日	PDIに至るまで
※KRAS変異陰性型(野生型)のみ	イリテカブン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロラシル(5-FU)	150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ²	点滴静注	90分 2時間	day1 day1		
	カルボウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	4時間	day1-2		

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1クール日数	総クール数
進行再発 FOLFIRI+Pmb	バニツムマブ(Pmab)	6mg/kg	点滴静注	1時間	day1	14日	PDIに至るまで
	イリトケン(CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注	90分	day1		
	レボホリナート(LV)	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1		
	フルオロラシル(5-FU)	400mg/m ²	急速静注	全開で	day1		
※KRAS変異陰性型(野生型)のみ	カルボカウンセル(5-FU)	2400mg/m ²	点滴静注	40時間	day1-2		

フルオロウラシル(5-FU) 2400mg/m²

レジメン名稱	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケル日数	総クール数
進行再発 IRIS	イリテカラン(CPT-11)	125mg/m ²	点滴静注	90分	day1,15	28日	PDJに至るまで
	テガフル/ギメラシル/オテラシル(S1)	80mg/m ²	経口投与	1日2回	day1タ~day15朝		
レジメン名稱	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケル日数	総クール数
進行再発 IRIS+BV	ベバシズマブ(BV)	5mg/kg	点滴静注	90分*	day1,15	28日	PDJに至るまで
	イリテカラン(CPT-11)	125mg/m ²	点滴静注	90分	day1,15		
	テガフル/ギメラシル/オテラシル(S1)	80mg/m ²	経口投与	1日2回	day1タ~day15朝		

※BVの投与時間は初回は90分、2回目は60分、忍容性が確認できれば3回目以降は30分での投与も可

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケル日数	総ケル数
進行再発 mFOLFOXIR+BV	ベビズムズ(BV)	5mg/kg	点滴静注	90分※	day1	14日	12ケル
	イリテカン(CPT-11)	150mg/m ²	点滴静注	90分	day1		
	オキサリブランチ(L-OHP)	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day1		
	レボポリノート(I-LV)	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1		
	フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1～3		

※BVの投与時間は初回は90分、2回目は60分、忍容性が確認できれば3回目以降は30分での投与可能

レジメン名称	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ケル日数	総ケル数
進行再発 TDF/TPI+BV	ベバシズマブ(BV) トリフルリジン・チビラニル(TDF/TPI)	5mg/kg 70mg/m ²	点滴静注 経口投与	90分※ 1日2回	day1,15 day1~day5,day8~12	28日	PDIに至るまで

※BVの授与時間は初回は90分、2回目は60分、忍容性が確認できれば3回目以降は30分での授与可

レジメン名	一般名(略号)	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	1ヶ月日数	総クール数
進行再発 Pembrolizumab 200mg							
※がん化学療法後に惜悪した進行再発の MSI-High結腸・直腸癌のみ	ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	day1	21日	PDに至るまで

進行再発 Pembrolizumab 400mg ※がん化学療法後に悪化した進行再発の M1c骨転移癌	ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注	30分	day1	42日	PDIに至るまで
---	----------	------------	------	-----	------	-----	----------